



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels zu berücksichtigen haben. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Tinatox[®], Creme

Wirkstoff: Tolnaftat

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 g Creme enthalten: 1 g Tolnaftat

Sonstige Bestandteile: Glycerol, Sorbinsäure, Milchsäure, Cetylstearylalkohol, Eumulgin B1, Cetylpalmitat, Glycerolmonostearat, mittelkettige Triglyceride, Isopropylmyristat, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 20 g Creme (N1)

Originalpackung mit 50 g Creme (N2)

Tolnaftat ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Antimykotika und wird zur äußerlichen Behandlung bestimmter Pilzkrankungen der Haut (Dermatomykosen) eingesetzt.

RIEMSER Arzneimittel AG

An der Wiek 7, 17498 Insel Riems

Anwendungsgebiete

Pilzkrankungen der Haut (Dermatomykosen), verursacht durch Hautpilze (Dermatophyten).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Tinatox[®], Creme nicht anwenden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Tolnaftat bzw. einen der weiteren Bestandteile sollte Tinatox[®], Creme nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die Anwendung von Tinatox[®], Creme sollte in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt erfolgen.

Tinatox[®], Creme darf während der Schwangerschaft nicht im Brustbereich angewendet werden, um einen direkten Kontakt des Säuglings mit dem Wirkstoff zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Tinatox[®], Creme ist nicht für eine Anwendung am Auge geeignet.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Tinatox[®], Creme ist wirksam bei Erkrankungen, die durch Dermatophyten hervorgerufen werden. Bei Dermatomykosen, die andere Ursachen haben (z. B. Sproß- und Hefepilze) bzw. die sich unter der Behandlung mit Tolnaftat nicht bessern, ist der Arzt aufzusuchen.



Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Tinatox[®], Creme oder werden in ihrer Wirkung durch Tinatox[®], Creme beeinflusst?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind von Tinatox[®], Creme nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Tinatox[®], Creme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Tinatox[®], Creme sonst nicht richtig wirken kann.

Wie oft, wann und wie sollten Sie Tinatox[®], Creme anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, wird Tinatox[®], Creme 1- bis 2mal täglich auf die befallenen Hautstellen aufgetragen und leicht eingerieben. Die erkrankte Hautpartie wird vorher gründlich gereinigt und sorgfältig getrocknet.

Wie lange sollten Sie Tinatox[®], Creme anwenden?

Die Behandlung sollte nach Abklingen der Beschwerden noch mindestens 14 Tage fortgesetzt werden, um Rückfälle zu vermeiden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was müssen Sie beachten, wenn Sie einmal vergessen haben, die Creme anzuwenden?

Wenn Sie einmal die Anwendung der Creme vergessen haben, wenden Sie die Creme unter Auslassung dieser einen Dosis weiterhin wie üblich an.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Beenden Sie die Anwendung mit der Creme nicht eigenmächtig, es sei denn, Sie vermuten eine schwerwiegende Nebenwirkung. In diesem Fall sollten Sie umgehend Rücksprache mit Ihrem Arzt nehmen.

Was ist zu tun, wenn Sie die Creme in zu großen Mengen oder zu häufig angewendet haben?

Wenn Sie versehentlich einmal die empfohlene Dosis überschritten haben oder die Creme zu häufig angewandt haben, sind im allgemeinen keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Tinatox[®], Creme auftreten?

Gelegentlich können leichte Hautreizungen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information

August 1999

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

MEDRecycling 

Code 98
1141242/10



RIEMSER
Arzneimittel AG

