

handlung nicht die doppelte Menge MYKO CORDES CREME an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Dosis wieder auf.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt die weitere Vorgehensweise, da in beiden Fällen der Behandlungserfolg gefährdet ist.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von MYKO CORDES CREME auftreten?

In seltenen Fällen können Hautreizungen (z. B. Brennen, Stechen) auftreten. Bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Clotrimazol oder einen der sonstigen Bestandteile sind allergische Reaktionen möglich.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nach diesem Datum nicht mehr.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: Oktober 1996

Tuben mit 25 g (N1), 50 g (N2) und 100 g (N3) Creme

ICHTHYOL-GESELLSCHAFT

**Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG
22335 Hamburg**



Hinweis:

Bei einer nur ungenügenden Behandlung kann es zu einem erneuten Auftreten der Erkrankung kommen. Deshalb ist es unerlässlich, auch nach Abklingen der Beschwerden noch eine gewisse Zeit nach Anweisung des Arztes weiterzubehandeln. Wichtig ist eine konsequente und ausreichend lange Behandlung. Hygienische Maßnahmen wie tägliches Wechseln von Handtüchern und Kleidungsstücken, die mit der erkrankten Haut in Berührung kommen, sind unbedingt zu beachten. Die Wäsche ist nach jedem Gebrauch durch Kochen zu desinfizieren; benutzen Sie bitte deshalb während der Behandlung nur kochfeste Unterwäsche und Handtücher.

Tragen Sie möglichst keine synthetische Unterwäsche.

MYKO CORDES CREME ist gut verträglich und zieht schnell in die Haut ein.

Viel Erfolg bei der Behandlung wünscht Ihnen die

ICHTHYOL-GESELLSCHAFT Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG

218116 0755 020/15-99



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

GEBRAUCHSINFORMATION

Bezeichnung des Arzneimittels

Myko Cordes® als Creme

Wirkstoff: Clotrimazol

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile:

1 g Creme enthält: Clotrimazol 0,01 g

Wirksame Bestandteile:

1 g Creme enthält: Phenoxylethanol 0,01 g

Sonstige Bestandteile:

Palmitoylascorbinsäure

DL- α -Tocopherol

Weißes Vaseline

Glycerolmonostearat

Octyldodecanol

Polysorbat 80

Tris-[Dodecylpoly(oxyethylen)-4]-phosphat

Sorbitanstearat

Polyacrylsäure

Natriumhydroxid

Gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

MYKO CORDES CREME ist in Tuben zu 25 g (N1), 50 g (N2) und 100 g (N3) erhältlich.

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Clotrimazol (Imidazol-Derivat)

Anti-Pilzmittel (Breitspektrum-Antimykotikum)

Pharmazeutischer Unternehmer

ICHTHYOL-GESELLSCHAFT

Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG

22335 Hamburg

Tel.: 0 40/5 07 14-0

Fax: 0 40/5 07 14-110





Anwendungsgebiete

Pilzinfektionen (Mykosen) der Haut durch Dermatophyten, Hefen (Candidaarten), Schimmelpilze (Aspergillusarten) und andere wie Malassezia furfur sowie Infektionen durch Corynebacterium minutissimum. Das können sein: Mykosen im Fußbereich, Mykosen der Haut und Hautfalten, Pityriasis versicolor, oberflächliche Candidosen, Erythrasma.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie MYKO CORDES CREME nicht anwenden?

Sie dürfen MYKO CORDES CREME nicht anwenden, wenn Ihnen bekannt ist, daß Sie eine Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Clotrimazol oder gegen einen der sonstigen Bestandteile haben.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Clotrimazolhaltige Präparate sollten in der Frühschwangerschaft nicht großflächig (nicht mehr als 30 % der Körperoberfläche) angewendet werden, da eine epidemiologische Studie Hinweise auf eine erhöhte Fehlgeburtsrate nach vaginaler Anwendung von Clotrimazol in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft ergeben hat.

Um den direkten Kontakt des Säuglings mit Clotrimazol zu vermeiden, sollte MYKO CORDES CREME von Stillenden nicht im Brustbereich angewendet werden.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu beachten?

Besondere Anpassungen sind nicht notwendig, da bei Anwendung von MYKO CORDES CREME keine vermehrten oder verstärkten Nebenwirkungen bekannt geworden sind.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel werden von MYKO CORDES CREME beeinflusst?

Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyantibiotika (Nystatin, Natamycin).

Beachten Sie bitte, daß diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Hinweis

Bei der Behandlung mit MYKO CORDES CREME im Genital- oder Analbereich kann es wegen der als Hilfsstoffe enthaltenen Fette und Emulgatoren bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Welche Kosmetika sollten Sie meiden?

Auf den erkrankten Hautstellen sollten Sie Desodorantien oder andere Kosmetika nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden, da eine Minderung der Wirksamkeit von MYKO CORDES CREME nicht ausgeschlossen werden kann.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt MYKO CORDES CREME nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da MYKO CORDES CREME sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie MYKO CORDES CREME anwenden?

Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach Art und Schwere des Krankheitsbildes sowie nach der Hautreaktion.

Soweit von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, werden die erkrankten Hautstellen zwei- bis dreimal täglich dünn mit MYKO CORDES CREME eingerieben. Für eine etwa handtellergroße Fläche ist meist ein etwa 1/2 cm langer Cremestrang ausreichend.

Wie sollten Sie MYKO CORDES CREME anwenden?

Reinigen Sie vor und nach jeder Behandlung gründlich Ihre Hände. Reinigen Sie die betroffenen Hautstellen gründlich mit lauwarmem Wasser.

Achten Sie unbedingt darauf, daß die zu behandelnde Haut völlig abtrocknet – dieses ist besonders wichtig, wenn Hautfalten betroffen sind.

Tragen Sie MYKO CORDES CREME anschließend dünn und gleichmäßig mit den Fingern auf, so daß der gesamte befallene Hautbereich mit der Creme bedeckt ist und reiben Sie anschließend die Creme in die Haut ein.

Wie lange sollten Sie MYKO CORDES CREME anwenden?

Für den Erfolg der Behandlung ist eine regelmäßige und ausreichend lange Anwendung von MYKO CORDES CREME erforderlich. Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Ausmaß und der Lokalisation der Erkrankung. Nach Abklingen der akuten entzündlichen Symptome und der subjektiven Beschwerden sollte mit MYKO CORDES CREME noch über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen weiterbehandelt werden, um eine vollständige Abheilung der Pilzkrankung zu erzielen.

Pityriasis versicolor heilt meist in ein bis drei Wochen, Erythrasma in zwei bis vier Wochen ab. Bei Fußpilz sollte – trotz schneller Besserung der Beschwerden – nach Verschwinden aller Krankheitszeichen noch circa zwei Wochen weiterbehandelt werden, um Rückfällen vorzubeugen. Nach jedem Waschen müssen die Füße, vor allem die Zehenzwischenräume, gründlich abgetrocknet werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Sie MYKO CORDES CREME in zu hohen Dosen angewendet haben?

Berichte über Vergiftungsfälle mit Clotrimazol liegen nicht vor. Es existiert kein spezielles Gegenmittel.

Bei vermehrter Anwendung können Hautreizungen auftreten, spezielle Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Was ist zu tun, wenn Sie eine Anwendung von MYKO CORDES CREME vergessen haben?

Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie bei der folgenden Be-

